

Algèbre 4 – Nombres complexes

Exercice 1 – Module et argument de $z = 1 - i \cdot \tan \theta$.

Exercice 2 – Calculer les racines carrées de $2 - 3i\sqrt{5}$.

Exercice 3 – Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - z + i + 1 = 0$.

Exercice 4 – Déterminer les racines de $X^4 + i$, sous forme trigonométrique, sous forme algébrique.

Exercice 5 – Donner une expression des racines n -ièmes de $\sqrt{3} + i$.

Exercice 6 – Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(z + 1)^n = (z - 1)^n$.

Exercice 7 – Linéariser $\sin^{2m} t$. En déduire $\int_0^\pi \sin^{2m} t \cos(2mt) dt$.

Exercice 8 – Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $P_n = (X + 1)^n - (X - 1)^n$.

1. Factoriser P_n dans $\mathbb{C}[X]$.
2. En déduire que : $\forall p \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{\prod_{k=1}^p \tan \frac{k\pi}{2p+1}} = \frac{1}{\sqrt{2p+1}}$.

Exercice 9 – Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)}$.

Exercice 10 – Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx)$.

Exercice 11 – Calculer $nz^{n-1} + (n-1)z^{n-2} + \dots + 2z + 1$. En déduire $\sum_{k=1}^{n-1} k \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right)$.

Exercice 12 – Calculer $\sum_{k=0}^n \sin^2(ka)$.

Exercice 13 – Calculer $1 + 2(\cos t + \cos 2t + \dots + \cos nt)$.

Exercice 14 – En factorisant de deux manières différentes $X^5 - 1$, calculer $\cos \frac{2\pi}{5}$ et $\cos \frac{4\pi}{5}$, puis $\cos \frac{\pi}{5}$.

Exercice 15 – Polynômes de Tchebychev de première espèce

On définit les polynômes de Tchebychev par la relation de récurrence suivante :

$$\begin{cases} T_0 = 1; & T_1 = X; \\ T_{n+1} = 2XT_n - T_{n-1} & \text{pour tout } n \geq 2. \end{cases}$$

1. Justifier que P_n est un polynôme, et déterminer son degré.
2. Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$.
3. En utilisant la formule de Moivre, en déduire une expression explicite de $T_n(\cos(\theta))$ comme un polynôme en $\cos(\theta)$.
4. En déduire une expression explicite du polynôme T_n .

Exercice 16 – Polynômes de Tchebychev de seconde espèce

Soit U_n la suite de polynômes définie par : $U_0 = 1$, $U_1 = 2X$ et $U_{n+2} = 2XU_{n+1} - U_n$.

$$1. \text{ Montrer que } U_n \left(\frac{1}{2} \left(X + \frac{1}{X} \right) \right) = \frac{X^{n+1} + \frac{1}{X^{n+1}}}{X + \frac{1}{X}}.$$

2. En déduire $U_n(\cos \theta)$.

3. En déduire une expression de $\sin(7\theta)$ en fonction de $\sin(\theta)$.

Exercice 17 – Soit $n \in \mathbb{N}^*$, et $P \in \mathbb{C}[X]$ un polynôme de degré n , tel que $P(0) = 1$ et $P(1) = 0$. On note, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\omega_k = e^{i \frac{2k\pi}{n+1}}$.

$$1. \text{ Montrer que } \sum_{k=0}^n P(\omega_k) = n + 1$$

$$2. \text{ En déduire que } \sup_{|z|=1} |P(z)| \geq 1 + \frac{1}{n}.$$

Exercice 18 – Le but de l'exercice est de montrer que si $\cos \theta = \frac{1}{p}$, où p est un entier impair au moins égal à 3, alors $\frac{\theta}{\pi}$ est irrationnel (on dit que $\arccos \frac{1}{p}$ est incommensurable à π). On raisonne par l'absurde en supposant que $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n}$, avec m et n premiers entre eux.

1. Déterminer explicitement des polynômes T_n et U_n tels que :

$$\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta) \text{ et } \sin(n\theta) = \sin \theta \cdot U_{n-1}(\cos \theta).$$

$$2. \text{ Montrer que } n = \sum_{j=1}^{E(\frac{n-1}{2})} (-1)^{j+1} \binom{n}{2j+1} (p^2 - 1)^j, \text{ puis que } n \text{ est pair et } m \text{ impair.}$$

$$3. \text{ Montrer que } 1 = \sum_{j=1}^{E(\frac{n}{4})} (-1)^{j+1} \binom{\frac{n}{2}}{2j} (p^2 - 1)^j. \text{ Conclure.}$$