Alain Troesch
Cours de mathématiques, MP2I
Lycée Louis-Le-Grand (Paris)
Année scolaire 2021/2022

Analyse – Chapitre 12
Équations différentielles

I. Équations différentielles linéaires

Définition 1.1 (Équation différentielle linéaire)

EDL d'ordre r d'une fonction inconnue y :

$$a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b(x), \text{ où}$$

- ▶ a_r n'est pas la fonction nulle,
- ▶ les a_i sont des fonctions à valeurs réelles ou complexes,
- ▶ y une fonction inconnue définie sur un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ (souvent à déterminer), à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I. Équations différentielles linéaires

Définition 1.1 (Équation différentielle linéaire)

EDL d'ordre r d'une fonction inconnue y :

$$a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b(x), \text{ où}$$

- ▶ a_r n'est pas la fonction nulle,
- ▶ les a_i sont des fonctions à valeurs réelles ou complexes,
- ▶ y une fonction inconnue définie sur un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ (souvent à déterminer), à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Extensions

- ▶ EDL d'ordre r à p fonctions inconnues $y_1, \dots, y_p$

I. Équations différentielles linéaires

Définition 1.1 (Équation différentielle linéaire)

EDL d'ordre r d'une fonction inconnue y :

$$a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b(x), \text{ où}$$

- ▶ a_r n'est pas la fonction nulle,
- ▶ les a_i sont des fonctions à valeurs réelles ou complexes,
- ▶ y une fonction inconnue définie sur un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ (souvent à déterminer), à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Extensions

- ▶ EDL d'ordre r à p fonctions inconnues $y_1, \dots, y_p$
- ▶ systèmes d'EDL.

Théorème 1.2 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soit $(E) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b(x)$

Théorème 1.2 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soit $(E) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b(x)$

$\mathcal{S}$ est soit **vide**

Théorème 1.2 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soit $(E) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b(x)$

$\mathcal{S}$ est soit vide soit de la forme : $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 + y_0$, où :

Théorème 1.2 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soit $(E) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \dots + a_r(x)y^{(r)} = b(x)$

$\mathcal{S}$ est soit vide soit de la forme : $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 + y_0$, où :

- ▶ $\mathcal{S}_0$ est l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée

Théorème 1.2 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soit $(E) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b(x)$

$\mathcal{S}$ est soit vide soit de la forme : $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 + y_0$, où :

- ▶ $\mathcal{S}_0$ est l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée
- ▶ y_0 est une solution particulière.

Théorème 1.2 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soit $(E) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \dots + a_r(x)y^{(r)} = b(x)$

$\mathcal{S}$ est soit vide soit de la forme : $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 + y_0$, où :

- ▶ $\mathcal{S}_0$ est l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée
- ▶ y_0 est une solution particulière.

De plus, $\mathcal{S}_0$ est alors **non vide et stable par combinaison linéaire**.

Théorème 1.2 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soit $(E) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b(x)$

$\mathcal{S}$ est soit vide soit de la forme : $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 + y_0$, où :

- ▶ $\mathcal{S}_0$ est l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée
- ▶ y_0 est une solution particulière.

De plus, $\mathcal{S}_0$ est alors non vide et stable par combinaison linéaire.

Structures

- ▶ $\mathcal{S}_0$: (sous)-espace vectoriel

Théorème 1.2 (Structure de l'ensemble des solutions)

Soit $(E) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \dots + a_r(x)y^{(r)} = b(x)$

$\mathcal{S}$ est soit vide soit de la forme : $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 + y_0$, où :

- ▶ $\mathcal{S}_0$ est l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée
- ▶ y_0 est une solution particulière.

De plus, $\mathcal{S}_0$ est alors non vide et stable par combinaison linéaire.

Structures

- ▶ $\mathcal{S}_0$: (sous)-espace vectoriel
- ▶ $\mathcal{S}$: **espace affine** (si non vide) = translaté d'un sous-espace vectoriel.

Proposition 1.3 (Principe de superposition)

Si $b = b_1 + b_2$, pour trouver une solution particulière y_0 de l'équation (E) , il suffit de trouver :

Proposition 1.3 (Principe de superposition)

Si $b = b_1 + b_2$, pour trouver une solution particulière y_0 de l'équation (E) , il suffit de trouver :

- ▶ une **solution particulière** y_1 de

$$(E_1) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b_1(x)$$

Proposition 1.3 (Principe de superposition)

Si $b = b_1 + b_2$, pour trouver une solution particulière y_0 de l'équation (E) , il suffit de trouver :

- ▶ une solution particulière y_1 de
 $(E_1) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b_1(x)$
- ▶ une **solution particulière y_2** de
 $(E_2) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b_2(x).$

Proposition 1.3 (Principe de superposition)

Si $b = b_1 + b_2$, pour trouver une solution particulière y_0 de l'équation (E) , il suffit de trouver :

- ▶ une solution particulière y_1 de
 $(E_1) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b_1(x)$
- ▶ une solution particulière y_2 de
 $(E_2) : a_0(x)y + a_1(x)y' + \cdots + a_r(x)y^{(r)} = b_2(x).$

Une solution particulière de (E) est alors $y_0 = y_1 + y_2$.

II. Équations différentielles linéaires d'ordre 1

II-1. Situation

Mise sous forme normale

- ▶ Forme étudiée : $a_1(x)y' + a_0(x)y = \beta(x)$, sur un intervalle I , avec a_1, a_2 continues.

II. Équations différentielles linéaires d'ordre 1

II-1. Situation

Mise sous forme normale

- ▶ Forme étudiée : $a_1(x)y' + a_0(x)y = \beta(x)$, sur un intervalle I , avec a_1, a_2 continues.
- ▶ Si a_1 ne s'annule pas sur I , on peut se ramener à $y' = a(x)y + b(x)$ (forme normale)

II. Équations différentielles linéaires d'ordre 1

II-1. Situation

Mise sous forme normale

- ▶ Forme étudiée : $a_1(x)y' + a_0(x)y = \beta(x)$, sur un intervalle I , avec a_1, a_2 continues.
- ▶ Si a_1 ne s'annule pas sur I , on peut se ramener à $y' = a(x)y + b(x)$ (forme normale)
- ▶ **Sinon** : étudier sur plusieurs intervalles séparément, puis essayer de raccorder.

II-2. Solutions de l'équation homogène

Théorème 2.1 (Résolution de $y' = a(x)y$ (a continue))

$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)}, C \in \mathbb{K}\}$, où A est une primitive de a ,

II-2. Solutions de l'équation homogène

Théorème 2.1 (Résolution de $y' = a(x)y$ (a continue))

$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)}, C \in \mathbb{K}\}$, où A est une primitive de a ,

Remarque 2.2 (Comment retrouver cette formule)

II-2. Solutions de l'équation homogène

Théorème 2.1 (Résolution de $y' = a(x)y$ (a continue))

$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)}, C \in \mathbb{K}\}$, où A est une primitive de a ,

Remarque 2.2 (Comment retrouver cette formule)

▶ Au brouillon : $\frac{y'}{y} = a(x)$.

II-2. Solutions de l'équation homogène

Théorème 2.1 (Résolution de $y' = a(x)y$ (a continue))

$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)}, C \in \mathbb{K}\}$, où A est une primitive de a ,

Remarque 2.2 (Comment retrouver cette formule)

- ▶ Au brouillon : $\frac{y'}{y} = a(x)$.
- ▶ On primitive $\ln |y(x)| = A(x) + k$

II-2. Solutions de l'équation homogène

Théorème 2.1 (Résolution de $y' = a(x)y$ (a continue))

$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)}, C \in \mathbb{K}\}$, où A est une primitive de a ,

Remarque 2.2 (Comment retrouver cette formule)

- ▶ Au brouillon : $\frac{y'}{y} = a(x)$.
- ▶ On primitive $\ln |y(x)| = A(x) + k$
- ▶ $|y(x)| = e^k e^{A(x)}$, puis $y = Ce^{A(x)}$.

II-2. Solutions de l'équation homogène

Théorème 2.1 (Résolution de $y' = a(x)y$ (a continue))

$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)}, C \in \mathbb{K}\}$, où A est une primitive de a ,

Remarque 2.2 (Comment retrouver cette formule)

- ▶ Au brouillon : $\frac{y'}{y} = a(x)$.
- ▶ On primitive $\ln |y(x)| = A(x) + k$
- ▶ $|y(x)| = e^k e^{A(x)}$, puis $y = Ce^{A(x)}$.
- ▶ Au propre : utiliser la **formule du cours** (pb de justification)

II-2. Solutions de l'équation homogène

Théorème 2.1 (Résolution de $y' = a(x)y$ (a continue))

$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)}, C \in \mathbb{K}\}$, où A est une primitive de a ,

Remarque 2.2 (Comment retrouver cette formule)

- ▶ Au brouillon : $\frac{y'}{y} = a(x)$.
- ▶ On primitive $\ln |y(x)| = A(x) + k$
- ▶ $|y(x)| = e^k e^{A(x)}$, puis $y = Ce^{A(x)}$.
- ▶ Au propre : utiliser la formule du cours (pb de justification)

Exemples 2.3

1. $y' = ay$ (a constant)

II-2. Solutions de l'équation homogène

Théorème 2.1 (Résolution de $y' = a(x)y$ (a continue))

$\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto Ce^{A(x)}, C \in \mathbb{K}\}$, où A est une primitive de a ,

Remarque 2.2 (Comment retrouver cette formule)

- ▶ Au brouillon : $\frac{y'}{y} = a(x)$.
- ▶ On primitive $\ln |y(x)| = A(x) + k$
- ▶ $|y(x)| = e^k e^{A(x)}$, puis $y = Ce^{A(x)}$.
- ▶ Au propre : utiliser la formule du cours (pb de justification)

Exemples 2.3

1. $y' = ay$ (a constant)
2. $y' = yx^\alpha$ sur $\mathbb{R}$ si $\alpha \geq 0$, sur $\mathbb{R}_+^*$ sinon.

└ II. Équations différentielles linéaires d'ordre 1

└ II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

Dans un premier temps : **essayer de deviner !** Parfois il y a une solution qui saute au yeux.

Méthode 2.4 (Méthode de variation de la constante)

1. Recherche sous la forme $x \mapsto C(x)e^{A(x)}$.

II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

Dans un premier temps : essayer de deviner ! Parfois il y a une solution qui saute au yeux.

Méthode 2.4 (Méthode de variation de la constante)

1. Recherche sous la forme $x \mapsto C(x)e^{A(x)}$.
2. En remplaçant dans l'équation différentielle, $x \mapsto C(x)$ s'obtient par **primitivation**.

II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

Dans un premier temps : essayer de deviner ! Parfois il y a une solution qui saute au yeux.

Méthode 2.4 (Méthode de variation de la constante)

1. Recherche sous la forme $x \mapsto C(x)e^{A(x)}$.
2. En remplaçant dans l'équation différentielle, $x \mapsto C(x)$ s'obtient par primitivation.

Exemples 2.5

II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

Dans un premier temps : essayer de deviner ! Parfois il y a une solution qui saute au yeux.

Méthode 2.4 (Méthode de variation de la constante)

1. Recherche sous la forme $x \mapsto C(x)e^{A(x)}$.
2. En remplaçant dans l'équation différentielle, $x \mapsto C(x)$ s'obtient par primitivation.

Exemples 2.5

1. Résoudre $y' = 2y + \sin(x) + e^x + x$ sur $\mathbb{R}$

II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

Dans un premier temps : essayer de deviner ! Parfois il y a une solution qui saute au yeux.

Méthode 2.4 (Méthode de variation de la constante)

1. Recherche sous la forme $x \mapsto C(x)e^{A(x)}$.
2. En remplaçant dans l'équation différentielle, $x \mapsto C(x)$ s'obtient par primitivation.

Exemples 2.5

1. Résoudre $y' = 2y + \sin(x) + e^x + x$ sur $\mathbb{R}$
2. Résoudre $y' = -\frac{y}{x} + \text{Arctan}(x)$ sur $\mathbb{R}_+^*$

└ II. Équations différentielles linéaires d'ordre 1

└ II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

Remarque 2.6

Ne pas foncer vers la méthode de variation de la constante

└ II. Équations différentielles linéaires d'ordre 1

└ II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

Remarque 2.6

Ne pas foncer vers la méthode de variation de la constante

Exemples 2.7

1. Solution particulière de $y' = ay + b$ (a, b constants)

└ II. Équations différentielles linéaires d'ordre 1

└ II-3. Recherche d'une solution particulière de $y' = a(x)y + b(x)$

Remarque 2.6

Ne pas foncer vers la méthode de variation de la constante

Exemples 2.7

1. Solution particulière de $y' = ay + b$ (a, b constants)
2. Solution particulière de $y' = ay + be^{\alpha x}$.

II-4. Problème de Cauchy associé à une EDL du premier ordre

Théorème 2.8 (Théorème de Cauchy-Lipschitz pour les équations linéaires d'ordre 1)

Soit a et b deux fonctions continues sur un intervalle I , à valeurs dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $(x_0, y_0) \in I \times \mathbb{K}$. Alors il existe **une et une seule solution** y de l'équation différentielle $y' = a(x)y + b(x)$ telle que $y(x_0) = y_0$.

II-5. Problèmes de raccordement (ou recollement)

Principe général pour $ay' + by = c$

- ▶ Enlever du domaine **les points x_i qui annulent a .**

II-5. Problèmes de raccordement (ou recollement)

Principe général pour $ay' + by = c$

- ▶ Enlever du domaine les points x_i qui annulent a .
- ▶ Sur chaque intervalle du domaine qui en résulte, mettre sous **forme normale**, et résoudre sur le principe précédent.

II-5. Problèmes de raccordement (ou recollement)

Principe général pour $ay' + by = c$

- ▶ Enlever du domaine les points x_i qui annulent a .
- ▶ Sur chaque intervalle du domaine qui en résulte, mettre sous forme normale, et résoudre sur le principe précédent.
- ▶ Essayer de raccorder aux points x_i , la fonction devant être **dérivable (donc aussi continue)** en x_i :

II-5. Problèmes de raccordement (ou recollement)

Principe général pour $ay' + by = c$

- ▶ Enlever du domaine les points x_i qui annulent a .
- ▶ Sur chaque intervalle du domaine qui en résulte, mettre sous forme normale, et résoudre sur le principe précédent.
- ▶ Essayer de raccorder aux points x_i , la fonction devant être dérivable (donc aussi continue) en x_i :
 - ▶ **Prolonger par continuité** (cela contraint en général les paramètres)

II-5. Problèmes de raccordement (ou recollement)

Principe général pour $ay' + by = c$

- ▶ Enlever du domaine les points x_i qui annulent a .
- ▶ Sur chaque intervalle du domaine qui en résulte, mettre sous forme normale, et résoudre sur le principe précédent.
- ▶ Essayer de raccorder aux points x_i , la fonction devant être dérivable (donc aussi continue) en x_i :
 - ▶ Prolonger par continuité (cela contraint en général les paramètres)
 - ▶ Vérifier la dérivabilité à l'aide du [théorème de la limite de la dérivée](#), en comparant la limite de y' à gauche et à droite de x_i .

II-5. Problèmes de raccordement (ou recollement)

Principe général pour $ay' + by = c$

- ▶ Enlever du domaine les points x_i qui annulent a .
- ▶ Sur chaque intervalle du domaine qui en résulte, mettre sous forme normale, et résoudre sur le principe précédent.
- ▶ Essayer de raccorder aux points x_i , la fonction devant être dérivable (donc aussi continue) en x_i :
 - ▶ Prolonger par continuité (cela contraint en général les paramètres)
 - ▶ Vérifier la dérivabilité à l'aide du **théorème de la limite de la dérivée**, en comparant la limite de y' à gauche et à droite de x_i .

Exemple 2.9

1. $\sqrt{|x|}y' = y$

II-5. Problèmes de raccordement (ou recollement)

Principe général pour $ay' + by = c$

- ▶ Enlever du domaine les points x_i qui annulent a .
- ▶ Sur chaque intervalle du domaine qui en résulte, mettre sous forme normale, et résoudre sur le principe précédent.
- ▶ Essayer de raccorder aux points x_i , la fonction devant être dérivable (donc aussi continue) en x_i :
 - ▶ Prolonger par continuité (cela contraint en général les paramètres)
 - ▶ Vérifier la dérivabilité à l'aide du [théorème de la limite de la dérivée](#), en comparant la limite de y' à gauche et à droite de x_i .

Exemple 2.9

1. $\sqrt{|x|}y' = y$
2. $xy' = y$.

II-6. Résolution des EDL d'ordre 1 à coefficients constants

Théorème 2.10 (Résolution d'une équation linéaire $y' = ay + b$ à coefficients constants)

▶ $\mathcal{S} = \left\{ y : x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}, C \in \mathbb{K} \right\},$

II-6. Résolution des EDL d'ordre 1 à coefficients constants

Théorème 2.10 (Résolution d'une équation linéaire $y' = ay + b$ à coefficients constants)

▶ $\mathcal{S} = \left\{ y : x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}, C \in \mathbb{K} \right\},$

▶ Unique solution telle que $y(x_0) = y_0 : \left(\frac{b}{a} + y_0 \right) e^{a(x-x_0)} - \frac{b}{a}.$

III. Résolution des EDL d'ordre 2 à coefficients constants

III-3. Position du problème

Le problème étudié ici

- ▶ Les outils matriciels permettent de mettre toute EDL linéaire d'ordre r (sous forme normale) sous forme d'une **EDL matricielle d'ordre 1**, pour laquelle les méthodes ci-dessus s'adaptent.

III. Résolution des EDL d'ordre 2 à coefficients constants

III-3. Position du problème

Le problème étudié ici

- ▶ Les outils matriciels permettent de mettre toute EDL linéaire d'ordre r (sous forme normale) sous forme d'une **EDL matricielle d'ordre 1**, pour laquelle les méthodes ci-dessus s'adaptent.
- ▶ En attendant : on résout les EDL à coefficients constants $y'' + ay' + by = f(x)$.

III. Résolution des EDL d'ordre 2 à coefficients constants

III-3. Position du problème

Le problème étudié ici

- ▶ Les outils matriciels permettent de mettre toute EDL linéaire d'ordre r (sous forme normale) sous forme d'une **EDL matricielle d'ordre 1**, pour laquelle les méthodes ci-dessus s'adaptent.
- ▶ En attendant : on résout les EDL à coefficients constants $y'' + ay' + by = f(x)$.
- ▶ Théorème de structure et de superposition valides.

Une méthode valide aussi pour des coefficients non constants :

Méthode 3.1 (Solutions de $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$)

Nécessite la connaissance d'une solution particulière y_0 de l'équation homogène.

Une méthode valide aussi pour des coefficients non constants :

Méthode 3.1 (Solutions de $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$)

Nécessite la connaissance d'une solution particulière y_0 de l'équation homogène.

- ▶ On pose $y = y_0 z$ (variation de la constante)

Une méthode valide aussi pour des coefficients non constants :

Méthode 3.1 (Solutions de $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$)

Nécessite la connaissance d'une solution particulière y_0 de l'équation homogène.

- ▶ On pose $y = y_0z$ (variation de la constante)
- ▶ z vérifie l'équation (d'ordre 1 en z') :

$$2y_0'z' + y_0z'' + ay_0z' = f(x).$$

Une méthode valide aussi pour des coefficients non constants :

Méthode 3.1 (Solutions de $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$)

Nécessite la connaissance d'une solution particulière y_0 de l'équation homogène.

- ▶ On pose $y = y_0z$ (variation de la constante)
- ▶ z vérifie l'équation (d'ordre 1 en z') :

$$2y_0'z' + y_0z'' + ay_0z' = f(x).$$

- ▶ Trouver z' par les méthodes précédentes, puis et **primitiver** encore pour obtenir z .

Une méthode valide aussi pour des coefficients non constants :

Méthode 3.1 (Solutions de $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$)

Nécessite la connaissance d'une solution particulière y_0 de l'équation homogène.

- ▶ On pose $y = y_0z$ (variation de la constante)
- ▶ z vérifie l'équation (d'ordre 1 en z') :

$$2y_0'z' + y_0z'' + ay_0z' = f(x).$$

- ▶ Trouver z' par les méthodes précédentes, puis et primitiver encore pour obtenir z .
- ▶ **Deux quadratures**, donc **deux paramètres** sur chaque intervalle (dimension 2)

Une méthode valide aussi pour des coefficients non constants :

Méthode 3.1 (Solutions de $y'' + a(x)y' + b(x)y = f(x)$)

Nécessite la connaissance d'une solution particulière y_0 de l'équation homogène.

- ▶ On pose $y = y_0z$ (variation de la constante)
- ▶ z vérifie l'équation (d'ordre 1 en z') :

$$2y_0'z' + y_0z'' + ay_0z' = f(x).$$

- ▶ Trouver z' par les méthodes précédentes, puis et primitiver encore pour obtenir z .
- ▶ Deux quadratures, donc deux paramètres sur chaque intervalle (dimension 2)
- ▶ Éventuels **raccordements** à faire si y_0 s'annule.

Exemples 3.2

- ▶ Il peut arriver qu'**une solution soit évidente**, mais pas les autres. La méthode ci-dessus est adaptée dans ce cas.

Exemples 3.2

- ▶ Il peut arriver qu'une solution soit évidente, mais pas les autres. La méthode ci-dessus est adaptée dans ce cas.
- ▶ Si a et b sont polynomiaux, on peut espérer trouver une **solution polynomiale**. Essayer de déterminer *a priori* le degré du polynôme.

Théorème 3.3 (Résolution de $y'' + ay' + by = 0$)

Soit Δ le discriminant de $X^2 + aX + b$ et r_1 et r_2 ses racines (réelles ou complexes)

Théorème 3.3 (Résolution de $y'' + ay' + by = 0$)

Soit Δ le discriminant de $X^2 + aX + b$ et r_1 et r_2 ses racines (réelles ou complexes)

▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta \neq 0$.

Théorème 3.3 (Résolution de $y'' + ay' + by = 0$)

Soit Δ le discriminant de $X^2 + aX + b$ et r_1 et r_2 ses racines (réelles ou complexes)

- ▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta \neq 0$.
- ▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto (c + dx)e^{rx}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta = 0$.

Théorème 3.3 (Résolution de $y'' + ay' + by = 0$)

Soit Δ le discriminant de $X^2 + aX + b$ et r_1 et r_2 ses racines (réelles ou complexes)

- ▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta \neq 0$.
- ▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto (c + dx)e^{rx}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta = 0$.

Terminologie 3.4 (polynôme caractéristique)

$X^2 + aX + b$ est le **polynôme caractéristique** de l'ED
 $y'' + ay' + by = 0$.

Théorème 3.3 (Résolution de $y'' + ay' + by = 0$)

Soit Δ le **discriminant** de $X^2 + aX + b$ et r_1 et r_2 ses racines (réelles ou complexes)

- ▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta \neq 0$.
- ▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto (c + dx)e^{rx}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta = 0$.

Terminologie 3.4 (polynôme caractéristique)

$X^2 + aX + b$ est le **polynôme caractéristique** de l'ED
 $y'' + ay' + by = 0$.

Remarques 3.5

1. Si $\Delta \neq 0$, la méthode 3.1 ne sert qu'à justifier qu'il n'y a **pas d'autre solution** que les exponentielles

Théorème 3.3 (Résolution de $y'' + ay' + by = 0$)

Soit Δ le discriminant de $X^2 + aX + b$ et r_1 et r_2 ses racines (réelles ou complexes)

- ▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta \neq 0$.
- ▶ $\mathcal{S}_0 = \{y : x \mapsto (c + dx)e^{rx}, c, d \in \mathbb{C}\}$ si $\Delta = 0$.

Terminologie 3.4 (polynôme caractéristique)

$X^2 + aX + b$ est le polynôme caractéristique de l'ED
 $y'' + ay' + by = 0$.

Remarques 3.5

1. Si $\Delta \neq 0$, la méthode 3.1 ne sert qu'à justifier qu'il n'y a pas d'autre solution que les exponentielles
2. Dans le cas où $\Delta = 0$, on en trouve d'autres.

Proposition 3.6 (des solutions complexes aux solutions réelles)

Soit $y'' + ay' + by = 0$ une équation différentielle linéaire à coefficients constants réels.

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re}(y) \mid y \in \mathcal{S}_{\mathbb{C}}\}.$$

Proposition 3.6 (des solutions complexes aux solutions réelles)

Soit $y'' + ay' + by = 0$ une équation différentielle linéaire à coefficients constants réels.

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re}(y) \mid y \in \mathcal{S}_{\mathbb{C}}\}.$$

Théorème 3.7 (Solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$)

On suppose $a, b \in \mathbb{R}$.

Proposition 3.6 (des solutions complexes aux solutions réelles)

Soit $y'' + ay' + by = 0$ une équation différentielle linéaire à coefficients constants réels.

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re}(y) \mid y \in \mathcal{S}_{\mathbb{C}}\}.$$

Théorème 3.7 (Solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$)

On suppose $a, b \in \mathbb{R}$.

► $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x} \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta > 0$;

Proposition 3.6 (des solutions complexes aux solutions réelles)

Soit $y'' + ay' + by = 0$ une équation différentielle linéaire à coefficients constants réels.

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re}(y) \mid y \in \mathcal{S}_{\mathbb{C}}\}.$$

Théorème 3.7 (Solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$)

On suppose $a, b \in \mathbb{R}$.

- ▶ $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x} \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta > 0$;
- ▶ $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto (cx + d)e^{rx} \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta = 0$;

Proposition 3.6 (des solutions complexes aux solutions réelles)

Soit $y'' + ay' + by = 0$ une équation différentielle linéaire à coefficients constants réels.

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re}(y) \mid y \in \mathcal{S}_{\mathbb{C}}\}.$$

Théorème 3.7 (Solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$)

On suppose $a, b \in \mathbb{R}$.

- ▶ $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x} \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta > 0$;
- ▶ $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto (cx + d)e^{rx} \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta = 0$;
- ▶ $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto e^{\alpha x} (c \cos(\omega x) + d \sin(\omega x)) \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta < 0$, où $r_1 = \alpha - i\omega$ et $r_2 = \alpha + i\omega$.

Proposition 3.6 (des solutions complexes aux solutions réelles)

Soit $y'' + ay' + by = 0$ une équation différentielle linéaire à coefficients constants réels.

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{\operatorname{Re}(y) \mid y \in \mathcal{S}_{\mathbb{C}}\}.$$

Théorème 3.7 (Solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$)

On suppose $a, b \in \mathbb{R}$.

- ▶ $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto ce^{r_1x} + de^{r_2x} \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta > 0$;
- ▶ $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto (cx + d)e^{rx} \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta = 0$;
- ▶ $\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \{x \mapsto e^{\alpha x} (c \cos(\omega x) + d \sin(\omega x)) \mid (c, d) \in \mathbb{R}^2\}$ si $\Delta < 0$, où $r_1 = \alpha - i\omega$ et $r_2 = \alpha + i\omega$.

Cas $\Delta < 0$:

$$\mathcal{S}_{\mathbb{R}} = \left\{ x \mapsto Ae^{\alpha(x-x_0)} \cos(\omega(x-x_0) - \varphi) \mid (A, \varphi) \in \mathbb{R}^2 \right\}$$

III-3. Solution générale du système non homogène

Pas de méthode générale au programme

Proposition 3.8 (Second membre $Q(x)e^{\lambda x}$, admis)

- ▶ Soit $Q \in \mathbb{C}[X]$, et $(E) : y'' + ay' + by = Q(x)e^{\lambda x}$.
- ▶ Soit P le polynôme caractéristique de l'équation (E) , et m la multiplicité de λ comme racine de P .

Il existe une solution particulière de (E) de la forme :

$$y_P(x) = x^m R(x)e^{\lambda x}, \text{ où } \deg(R) = \deg(Q).$$

III-3. Solution générale du système non homogène

Pas de méthode générale au programme

Proposition 3.8 (Second membre $Q(x)e^{\lambda x}$, admis)

- ▶ Soit $Q \in \mathbb{C}[X]$, et $(E) : y'' + ay' + by = Q(x)e^{\lambda x}$.
- ▶ Soit P le polynôme caractéristique de l'équation (E) , et m la multiplicité de λ comme racine de P .

Il existe une solution particulière de (E) de la forme :

$$y_P(x) = x^m R(x)e^{\lambda x}, \text{ où } \deg(R) = \deg(Q).$$

Ce résultat reste valide pour des équations d'ordre plus important.

III-3. Solution générale du système non homogène

Pas de méthode générale au programme

Proposition 3.8 (Second membre $Q(x)e^{\lambda x}$, admis)

- ▶ Soit $Q \in \mathbb{C}[X]$, et $(E) : y'' + ay' + by = Q(x)e^{\lambda x}$.
- ▶ Soit P le polynôme caractéristique de l'équation (E) , et m la multiplicité de λ comme racine de P .

Il existe une solution particulière de (E) de la forme :

$$y_P(x) = x^m R(x)e^{\lambda x}, \text{ où } \deg(R) = \deg(Q).$$

Ce résultat reste valide pour des équations d'ordre plus important.

Exemple 3.9

- ▶ Solution particulière de $y'' + 2y' + y = e^x$

III-3. Solution générale du système non homogène

Pas de méthode générale au programme

Proposition 3.8 (Second membre $Q(x)e^{\lambda x}$, admis)

- ▶ Soit $Q \in \mathbb{C}[X]$, et $(E) : y'' + ay' + by = Q(x)e^{\lambda x}$.
- ▶ Soit P le polynôme caractéristique de l'équation (E) , et m la multiplicité de λ comme racine de P .

Il existe une solution particulière de (E) de la forme :

$$y_P(x) = x^m R(x)e^{\lambda x}, \text{ où } \deg(R) = \deg(Q).$$

Ce résultat reste valide pour des équations d'ordre plus important.

Exemple 3.9

- ▶ Solution particulière de $y'' + 2y' + y = e^x$
- ▶ Solution particulière de $y'' + y' + y = \sin(x)$